

GERİATRİK YOĞUN BAKIM HASTALARINDA İLAÇLA İLİŞKİLİ SORUNLARIN BELİRLENMESİ

Zümra KARAKURT

ORCID: 0009-0004-0732-8196

**BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK
ECZACILIK ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI**

MEZUNİYET TARİHİ:13.02.2025

İletişim:Zumra.karakurt.001@gmail.com

DANIŞMAN

Dr.Ögr. Üyesi Muhammed Yunus BEKTAY
ORCID: 0000-0003-2032-9957

**BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KLİNİK ECZACILIK ANABİLİM DALI
İSTANBUL – TÜRKİYE
YBektay@bezmialem.edu.tr**

TEZ ÖZETİ

Bu çalışmada, yoğun bakımda yatışı olan geriatrik hastalarda STOPP-START kriterlerine göre potansiyel uygunsuz ilaç kullanımını (PIM) retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 496 hastanın %94,6'sında en az bir PIM saptanmış, %65,23'ü START kriterleriyle ve %89,84'ü kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili bulunmuştur. Klinik eczacılar, bu tür uygunsuzlukların belirlenmesi ve önlenmesinde önemli bir rol üstlenebilir.

TEZ SONUÇLARININ UYGULAMA ALANLARI

Geriatrik yoğun bakım hastalarında kardiyovasküler hastalıklar ve potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı (PIM) sıklıkla görülmektedir.Klinik eczacılar, PIM tespiti ve tedavi optimizasyonu ile hasta güvenliğini artırmada önemli bir rol oynamaktadır.

AKADEMİK FAALİYETLER

1. International Congress of Gerontology
Determination of Inappropriate Medication Use in Geriatric Intensive Care Patients According to STOPP-START Criteria
- 2.Karakurt Z., Bektay M.Y. *Inappropriate Drug Use in Critical Geriatric Care: A Retrospective Analysis According to STOPP-START Criteria. ESCP International Workshop*, 24–25 Nisan 2024, Bratislava, Slovakia. *Int J Clin Pharm*, 46, 761–775 (2024).
<https://doi.org/10.1007/s11096-024-01747-5>



ANAHTAR KELİMELER

- START-STOP Kriteri
- Geriatri
- Yoğun Bakım Ünitesi
- Potansiyel Uygunsuz İlaç
- Kardiyoloji

